



Zaragoza 20 de marzo de 2020

Considerando la actual situación de pandemia por SARS-COV-2, declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) a fecha de 11/03/2020, y las medidas del estado de alerta establecidas en España el 14/03/2020, el GEEDL y la FEETEG quieren realizar las siguientes precisiones:

Las enfermedades de depósito lisosomal no inducen en si mismas una situación de inmunosupresión profunda, pero hay que tener en cuenta los factores de riesgo asociados como la esplenectomía previa además de los comunes a los de la población general (edad, diabetes, HTA, neutropenia, tabaquismo etc...).

Los coronavirus humanos son un grupo de virus envueltos en cápsides que contiene RNA no segmentado, monocatenario y de sentido positivo. Existen muchas variantes y algunas de ellas afectan a humanos, como la actual por SARS-CoV-2 produciendo un cuadro de infección de vías respiratorias de menor a mayor gravedad.

La transmisión se produce preferentemente por cercanía de persona a persona infectada con COVID-19, principalmente a través de gotitas respiratorias producidas cuando la persona infectada tose o estornuda. Las gotitas pueden caer en la boca, la nariz o los ojos de las personas cercanas o posiblemente también ser inhaladas a los pulmones de las personas cercanas. La transmisión por el aire a larga distancia de persona a persona es poco probable.

Por tanto, es recomendable minimizar en lo posible situaciones de riesgo, evitar acudir a los centros sanitarios, realizar las consultas programadas de revisión de forma telemática o aplazándolas. Diferir exploraciones de imagen y analíticas hasta que la situación sanitaria se normalice, salvo en el caso de procesos agudos que puedan surgir.

Los pacientes en tratamiento sustitutivo que reciben la infusión intravenosa en centros hospitalarios, en todos los casos que sea posible es recomendable que la administración sea domiciliaria al objeto de que no se pierda la pauta terapéutica de administración cada dos semanas, y en caso de que esta acción no sea posible, evaluar en cada caso aplazamiento del tratamiento u otras opciones.

Seguir estrictamente las recomendaciones de higiene y aislamiento que ha establecido el Gobierno y la OMS a través del Instituto Carlos III (<https://covid19.isciii.es>).

Quedamos a disposición de los profesionales que atienden a estos pacientes y a los pacientes y familiares para atender cualquier duda o cuestión.

Fdo: Pilar Giraldo
Presidenta FEETEG

Fdo:Ignacio de Blas Giral
Secretario FEETEG